

## JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADANIA?

1. Próbkę należy pobrać do standardowego pojemnika na kał (z łyżeczką w nakrętce) dostępnego w większości aptek.
2. **NIE WOLNO** stosować pojemników, które zawierają wewnątrz jakiegokolwiek substancje stabilizujące.
3. Próbka **MUSI** zostać pobrana podczas pierwszego wypróżnienia.
4. Przed oddaniem kału **NALEŻY** całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
5. Stolec, z którego pobierana jest próbka **NIE MOŻE** znaleźć się w kontakcie z wodą obecną w muszli klozetowej (resztki środków do czyszczenia toalet, które mogą znajdować się w wodzie znacząco wpływają na wynik testu).
6. W przypadku sedesów z tzw. półką, muszlę należy wysuszyć i wyłożyć papierem toaletowym. W przypadku toalet bez półki, pobranie próbki może być znacząco utrudnione. Zaleca się wykorzystanie **czystego naczynia** (kaczki, basenu lub słoika).
7. Za pomocą łyżeczki pojemnika transportowego należy pobrać próbkę o **wielkości orzecha włoskiego**. Zaleca się, aby materiał w próbce pochodził z **kilku miejsc** stolca.

**Pacjent dostarcza do Przychodni próbkę kału w specjalnym pojemniku.**